## GENERAL DESCRIPTION OF THE WAPAWEKKA MAP SHEET AREA, 731

The area covered by the Wapawekka map sheet comprises 5570 square miles in central Saskatchewan between 54° and 55° North latitude and 104° and 106° West longitude. The area lies north of the settled farmlands and no permanent settlements exist, except the small Indian population on reserves adjoining Montreal Lake. The area is essentially a region of plains in which rolling or hilly lands are occasionally prominent. Most of the area lies in the Mixedwoods Section of the southern Boreal Forest Region and is included within the Northern Provincial Forest. Many lakes, some very large, are present and swamp and bogs are widespread.

The low-lying lands along the northern and eastern borders have elevations between 1200 and 1700 feet. Except for a north-south lowland corridor around Montreal Lake, the rest of the area is rolling moraine-covered lands with elevations between 2600 feet. The drift-covered sedimentary rocks are typical of most of the area except for the ice-scoured crystalline bedrock of the northeast.

The crystalline bedrock is part of the Canadian Shield physiographic region, which was formed during the Precambrian era. Outcrops of granites, granodiorites, and allied rocks are common in the rolling areas on the southeastern and northern shores of Wapawekka Lake and the southeastern shore of Lac La Ronge. Various metamorphic rocks of sedimentary and volcanic origin occur at the eastern and northeastern end of Wapawekka Lake. Where the granitic rocks form the margins of lakes, the shorelands are fairly steep and scenic though the backshores may be relatively inaccessible. Although exposed bedrock is common, the rock basins and low-lying regions are covered by varying depths of sandy-loamy till. These basins and low-lying sections are poorly drained and commonly are occupied by fen or muskeg.

Adjacent to and overlapping this segment of the Canadian Shield are dolomites and limestones of Cambrian and Devonian age. Bedrock over most of the southern region is of sandstones, siltstones, and shales of Cretaceous age thickly covered by glacial drift. Adjacent to the Shield, the region was scoured by glaciers; exposures (Outcrops) of sedimentary rock are common, and glacial drift is generally thin and sandy. The extensive southern region that is underlain by sedimentary rocks is part of the Saskatchewan Plains, or Second Prairie Level, physiographic region.

Within the Saskatchewan Plains section there are two stretches of fairly high land. One stretch extends southwestward from the narrow Wapawekka Hills to the eastern side of Nipekamew Lake and then widens to cover most of the region between Montreal Lake and Sandy Lake. Elevations exceed 1700 feet above sea level and reach 2600 feet in the Wapawekka Hills, 2500 feet in the Cub Hills, and 2290 feet east of the Whiteswan Lakes. This upland forms part of the drainage divide between the Churchill River and Saskatchewan River basins.

The Wapawekka Hills is a well-marked tableland with greatly dissected escarpments on the west, east, and north sides. In the south, the surface is moderately rolling to hilly, covered by deep glacial deposits including ground, kame, and end moraines. An east-facing escarpment, especially steep and deeply dissected by streams, is evident in the Cub Hills. Swamps and bogs are widespread.

A second belt of higher land lying west of Montreal Lake reaches more than 2400 feet in the Thunder Hills. Like the Wapawekka and Cub hills, this section is a gently to strongly rolling morainic plain, with frequent glaciofluvial deposits, and eskers.

Lowlands of the Wapawekka and Cub hills, on the northwestern flank, and between the Wapawekka, Club,and Thunder hills. The lowlands consist mainly of gently undulating to gently rolling till and sandy outwash plains. Poor drainage is characteristic of this region and swamps and bogs are widespread.

### CLIMATE

The climate of the area is subhumid (Thornthwaite), with cold snowy winters and short, cool summers. The uplands are cooler and receive more precipitation. July mean temperatures are 61° F in the north and 62° F in the south, though only 59° F in the hills. The frost free season averages 70 to 80 days in the south and in localities affected by large lakes, but decreases to 60 days or less in the north and uplands. Maximum and minimum temperatures of 100 F and -60 F have been recorded. Total annual precipitation is 16 to 20 inches, of which nearly one third falls as snow.

The area lies in the Mixedwood Section of the southern Boreal Forest Region. White spruce and trembling aspen are common on the uplands and often occur with balsam poplar, balsam fir, and white birch. Black spruce and tamarack occupy poorly drained sections and black spruce also grows on uplands with shallow drift cover. Jack pine grows on dry sites and is especially evident in recent burns. In the south, where trembling aspen and other deciduous trees are common, a well-developed undergrowth of shrubs and herbs is more usual than in the dominantly coniferous forest north of the Canadian Shield boundary. Swamp, muskeg, and fens are widespread throughout the area.

Gray Luvisol soils are typical of the south and podzolic soils are common elsewhere. The distribution of soils is complicated by the complex arrangement of hills and lowlands and the frequency of wetlands. Fibrisols, or deep moss peat, are widespread. Some poorly drained organic soils remain frozen through much of the summer and permanently frozen ground is reported east of Big Sandy Lake.

### FISH AND WILDLIFE

Angling capability is moderate to excellent throughout the area. Commercial fishing is important in a number of lakes, particularly at Lac la Ronge and Montreal Lake. Although accounts for most of the catch, pickerel, northern pike, and lake trout are the other main commercial species. Some coarse fish such as burbot and lake herring are also taken. Northern pike, pickerel, and perch are the chief sport species in most lakes and rivers; lake trout mainly restricted to Lac la Ronge. A program of fish stocking has introduced rainbow and brook trout into the streams and lakes of the southeast, particularly near the Hanson Lake Road.

Various migratory waterfowl are found in the area. The Sandhill Crane, Canada Goose, Mallard, Common Snipe, Bufflehead, Pintail, Ring-necked Duck, and others commonly breed within the area. The Snow Goose and White-fronted Goose migrate through the area during spring and fall. The chief species of upland game birds include Spruce Grouse and Ruffed Grouse.

Moose is the most important big game animal. The southern part of the area constitutes the northern limit of range for elk and deer, and, approximately, the southern limit of range for woodland caribou. Among the better regions for ungulates are the Wapawekka Hills, Cub Hills, and Thunder Hills. Among the animals trapped for fur are the beaver, mink, squirrel, muskrat, and lynx; the black bear and gray wolf are also present.

### SETTLEMENT AND LAND USE

The area lies entirely within the Northern Provincial Forest. The first European settlement began with the fur trade in the 1700s. Ports were established on the North Saskatchewan River by 1776, and at Lac la Ronge by 1793. Logging operations began in the early 1900s and are still an important industry today. Commercial fishing also commenced fairly early with winter-harvested fish moving from Montreal Lake to Prince Albert. Prince Albert became the center of a considerable freshwater fishing industry.

In 1927, Prince Albert National Park was established and by 1932 the gravel highway connecting Prince Albert with the National Park was extended to the Indian settlement at the south end of Montreal Lake. By1952 Highway 169 was extended to La Ronge, a few miles north of the area. Many resource roads have been built to assist forest and other operations and to provide access to recreation regions. The most important of these is the Hanson Lake Road or Highway 106, which crosses the southeast close to some excellent angling lakes and to some of the more productive forest lands. Connecting these two highways and crossing the northern part of the area is a poorer road, Highway 165. This highway was built to facilitate the movement of trucks carrying ore from the Precambrian rocks north of Lac La Ronge to the smelter at Flin Flon, Man. The road from Montreal Lake to La Ronge formerly followed the eastern side of Montreal Lake; Highway 2 has now been built on the western side.

The only permanent settlements are the small communities of Montreal Lake, Timber Bay, and Molanosa. At present, the forest and fish and game industries are the most important economic activities in the area.

### RECREATION CAPABILITY

Despite new roads and the new emphasis being placed on the town of La Ronge as an administrative center for northern Saskatchewan, this area is still remote. The highway from Prince Albert to La Ronge has encouraged movement on the western side, carrying both northern administrators and prospectors searching for the minerals of the Canadian Shield. For the past thirty years this highway carried increasing numbers of sport fisherman to Lac la Ronge and, with the extension of the road, has taken vacationers far into the Canadian Shield region. The Hanson Lake Road is much more recent but has improved the recreation in the area because it passes near many small lakes and uplands of good recreation potential.

The upland sections are mainly rated moderately low to very low (Classes 5 to 7) in capability. The extensive fens, bogs, and muskegs north of Montreal Lake, north of Meeyomoot Lake, south of Lac la Ronge, and near Big Sandy Lake, have very little recreational capability and are rated Class 7.

Other upland units have more potential. Some, such as the Thunder Hills, the Wapawekka Hills, and the greatly dissected Cub Hills escarpment, are rated Class 5 because of their special topographic patterns and wildlife. The region of rolling, broken kame moraine containing Steepbank, Clarence, Summit, and other small lakes and various streams has considerable diversity in terrain, vegetation, and wildlife. The shorelands of these small lakes have moderate capabilities for angling, boating, and camping. The upper reaches of Nipekamew River, despite its rapids, - and Montreal and Bear rivers are capable of supporting activities such as canoeing, angling, and camping. In the south, east of Lower Fishing Lake and within the Nipawin Provincial Park, a very prominent esker is rated capability Class 5.

The lakes provide the main focus for recreation activity. This is a noted angling area, and there are resorts, campgrounds, or fishing camps on many of the lakes. Variation in the size of lakes and the nature of their shorelines, scenic attractiveness, and other characteristics provide different recreational opportunities.

The southern shorelands of Lac la Ronge have one Class 2 beach unit and a number of shoreland units of moderate and moderately high capability. Much of the shoreland is rated moderately low and low because of poorly drained backshores or boulder-strewn foreshores or both. Montreal Lake exhibits somewhat similar conditions but a larger proportion of the shoreland is rated Class 5 or 6 because of poor drainage. Lac la Ronge and Montreal Lake experience strong winds, but their capability is not reduced by this factor. Deep northern lakes such as Lac la Ronge have cold waters and swimming and beach activities are restricted to the many sheltered shallow bays.

On the third large lake, Wapawekka, backshores generally are well drained and well treed and some good beaches are present. The backshores are more scenic than those of Montreal Lake because of stronger relief and variety in rock outcrop. Eastward, Deschambault River, rated Class 5CAK, leads from Wapawekka Lake to Deschambault Lake and, by way of other streams, lakes, and portages, to the historic Sturgeon-weir River and its water connections.

The lakes of the south-central section are smaller but many have shorelands of moderate to very high capability. In general, they have well-drained, well-treed backshores and good development potential. Most lakes are set deep in the landscape, some in glacial meltwater channels. At the northern ends of some lakes, such as the Whiteswan Lakes, the backshores are poorly drained and merge with muskeg. Whiteswan, Little Bear, East Trout, and Lower Fishing lakes are among the best of this group of lakes and they all have some very good beaches. Farther east, Big Sandy Lake has shorelands of moderate to moderately low capability, except on the low-lying eastern shores, which are backed by bog. Angling success is good on most lakes.

Many of the smaller lakes, such as Molanosa and Shallow, together with some of the shorelands and islands of Maymoot, Nipekamew, Montreal, and other lakes, provide excellent duck habitat. Duck and moose hunting and viewing increase the recreation capability of the area by providing more variety and a longer season.

*Capability classification by J. H. Richards, Department of Geography, University of Saskatchewan, Saskatoon, 1973.*

## DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE LA FEUILLE DE WAPAWEKKA 731

Le territoire représenté sur la feuille de Wapawekka occupe 5 570 milles carrés dans le centre de la Saskatchewan, entre 54 et 55° de latitude nord et 104 et 106° de longitude ouest. Le territoire est juste au nord des derniers secteurs agricoles habités et ne renferme aucun établissement permanent à l'exception de petites réserves indiennes dans le voisinage du lac Montréal. Le territoire est essentiellement une région de plaines dont l'uniformité est parfois interrompue par la topographie vallonnée ou montueuse de certains secteurs. Le territoire appartient presque entièrement à la section de la forêt mixte de la région forestière boréale; il fait également partie de la forêt provinciale du Nord. Les lacs sont nombreux et certains d'entre eux sont très grands; il y a aussi beaucoup de marais et de fondrières.

Dans les basses terres qui bordent le territoire au nord et à l'est, l'altitude varie de 1 200 à 1 700 pi. Exception faite d'un couloir de basses terres de direction nord-sud autour du lac Montréal, le territoire est formé de terres vallonnées couvertes de moraine et d'une altitude approximative de 2 600 pi. A travers la majeure partie du territoire, on est en présence de roches sédimentaires couvertes de drift; dans le nord-est, on a une assise rocheuse cristalline que découpe la glace.

Ces roches cristallines appartiennent au Bouclier canadien formé au précambrien. Les affleurements de granites, de granodiorites et de roches de même nature sont communs dans les secteurs vallonnés des rives nord et sud-est du lac Wapawekka et de la rive sud-est du lac La Ronge. Au nord-est et à l'est du lac Wapawekka, il y a des roches métamorphiques d'origine sédimentaire ou volcanique. Là où les lacs sont bordés de roches granitiques, les rivages sont pittoresques mais escarpés et les arrière-plages peuvent être très difficiles d'accès. Malgré que les affleurements rocheux soient fréquents, les bassins de roche en place et les régions basses sont couvertes de till sablo-loameux d'épaisseur variable. Ces bassins et ces régions basses sont mal drainés et des marais ainsi que des marécages les occupent habituellement.

A côté de ce secteur du Bouclier canadien et le chevauchant par endroits, on trouve des dolomies et des calcaires cambriens et dévoniens. La roche en place, à travers la majeure partie du sud de cette région, est formée de grès, de siltstones et de shales crétacés disparaissant sous d'épais dépôts de drift glaciaire. Dans le voisinage du Bouclier, les glaciers ont décapé la région; les roches sédimentaires affleurent en de nombreux endroits et le drift glaciaire est habituellement mince et sableux. Dans le sud, la région qui repose sur des roches sédimentaires appartient aux plaines de la Saskatchewan, ou second palier de la prairie.

Dans la région des plaines de la Saskatchewan, il y a deux secteurs de terres assez élevées. Le premier prend naissance dans les étroites collines Wapawekka et s'étend vers le sud-ouest jusqu'à l'est du lac Nipekamew où il s'élargit et occupe la majeure partie de la région située entre les lacs Montréal et Sandy. L'altitude supérieure à 1 700 pi, en atteint 2 600 et 2 990 dans les collines Wapawekka, 2 500 dans les collines Cub à l'est des lacs Whiteswan. Ce bas-plateau forme une partie de la ligne de partage des eaux qui sépare les bassins du fleuve Churchill et de la rivière Saskatchewan.

Les collines Wapawekka forment un plateau bien délimité dû aux escarpements profondément accidentés qui le bordent à l'ouest, à l'est et au nord. Au sud, le terrain est modérément vallonné ou montueux et couvert d'épais dépôts glaciaires comprenant de la moraine de fond, des kames et des moraines terminales. Dans les collines Cub, l'escarpement orienté à l'est est particulièrement escarpé et les cours d'eau l'entaillent profondément. Les marais et les fondrières sont fréquents.

Un autre secteur de hautes terres apparaît à l'ouest du lac Montréal; son altitude dépasse 2 400 pi dans les collines Thunder. Comme les collines Wapawekka et Cub, ce secteur est une plaine morainique dont la topographie varie de légèrement à fortement vallonnée et qui renferme d'abondants dépôts fluvio-glaciaires et des eskers.

Les basses terres des collines Wapawekka et Cub apparaissent au nord-ouest des collines et entre les collines Wapawekka, Cub et Thunder. Ces basses terres sont des plaines de till et d'épandages sableux dont la topographie varie de légèrement onduleuse à légèrement vallonnée. Les conditions de drainage sont médiocres dans cette région qui renferme en outre un grand nombre de marais et de fondrières.

### CLIMAT

Le climat du territoire est un climat subhumide (Thornthwaite): hivers froids et neigeux, étés courts et frais. Sur les bas-plateaux, le climat est plus frais et la précipitation, plus abondante. En juillet, la température moyenne est de 61° F dans le nord et de 62 dans le sud; elle n'est que de 59 dans les collines. La saison sans gel dure en moyenne de 70 à 80 jours dans le sud ou dans le voisinage des grands lacs mais elle passe à 60 jours ou moins dans le nord et sur les bas-plateaux. Des températures maximale et minimale de 100 et -60° F ont déjà été enregistrées. La précipitation annuelle totale varie de 16 à 20 po; près du tiers de cette précipitation tombe sous forme de neige.

Le territoire appartient à la section de la forêt mixte de la région méridionale de la forêt boréale. L'épinette blanche et le peuplier faux-tremble croissent communément sur les bas-plateaux, souvent associés au peuplier baumier, au sapin baumier et au bouleau blanc. L'épinette noire et le mélèze laricin occupent les secteurs mal drainés; l'épinette noire croît également dans les secteurs de bas-plateaux couverts de minces couches de drift. Le pin gris croît dans les endroits secs et on le remarque plus particulièrement sur les brûlis d'origine récente. Dans le sud, là où le peuplier faux-tremble et d'autres feuillus sont les essences communes, un sous-bois formé d'herbes et d'arbrisseaux est chose plus commune que dans les forêts du Bouclier canadien formées surtout de conifères. On trouve des marais, des marécages et des fondrières à travers tout le territoire.

Les luvisols gris sont typiques dans le sud et les sols podzoliques sont communs partout ailleurs. La disposition complexe des collines et des basses terres ainsi que l'abondance de mouillères viennent compliquer la répartition des sols. Les fibrisols ou les tourbes épaisses sont répandus. Certains sols organiques mal drainés demeurent gelés pendant une bonne partie de l'été et on a trouvé du pergélisol à l'est du Grand lac Sandy.

### POISSON ET GIBIER

Les possibilités de pêche sportive varient de modérées à excellentes à travers tout le territoire. La pêche commerciale est importante dans un certain nombre de lacs et plus particulièrement au lac La Ronge et au lac Montréal. Malgré que représente la majeure partie des prises, le doré jaune, le grand brochet et la truite grise sont d'autres espèces commerciales importantes. On pêche aussi certaines espèces ordinaires comme la lotte et le cisco. Le grand brochet, le doré et la perchaude sont les principales espèces que recherchent les amateurs de pêche sportive dans les lacs et les rivières. On trouve de la truite grise surtout dans le lac La Ronge. Un programme d'empoissonnement a permis d'introduire la truite arc-en-ciel et la truite mouchetée dans les cours d'eau et les lacs du sud-est et, plus particulièrement, dans ceux qui se trouvent à proximité de la route du lac Hanson.

Différentes espèces d'oiseaux migrateurs sont représentées sur le territoire. La grue canadienne, l'outarde, le canard malard, la bécassine ordinaire, le petit garrot, le canard pilet, le morillon à collier et d'autres espèces se reproduisent communément sur le territoire. L'oie blanche et l'oie à front blanc traversent le territoire au printemps et à l'automne. Dans les régions de bas-plateaux, le gibier à plumes comprend principalement le tétras des savanes et la gélinotte huppée.

L'orignal est la principale espèce de gros gibier. La partie méridionale du territoire est la limite septentrionale de l'aire qu'habitent le wapiti et le cerf; c'est également la limite méridionale approximative de l'aire qui convient au caribou des bois. Parmi les meilleures régions pour les Ongulés, on connaît les collines Wapawekka, les collines Cub et les collines Thunder.

Le castor, le vison, l'écureuil, le rat musqué et le lynx sont recherchés pour leur fourrure; l'ours noir et le loup sont également représentés.

### PEUPLEMENT ET UTILISATION DE LA TERRE

Tout le territoire fait partie de la forêt provinciale du Nord. Les premiers établissements européens apparurent au 18e siècle, à l'époque de la traite des fourrures. Des ports ont été créés sur la rivière Saskatchewan-Nord dès 1776 et au lac La Ronge dès 1793. L'exploitation des produits de la forêt commença au début des années 1900 et elle est demeurée une industrie importante. La pêche commerciale aussi a débuté assez tôt; les poissons pêchés en hiver étaient transportés de Montreal Lake à Prince Albert. Prince Albert est devenu le centre d'une importante industrie de pêche en eau douce.

En 1927, on créait le parc national de Prince Albert et, dès 1932, la route de gravier reliant Prince Albert au parc national était prolongée jusqu'à la réserve indienne de l'extrémité méridionale du lac Montréal. En 1952, la route 169 conduisait jusqu'à La Ronge, à quelques milles au nord du territoire. Un grand nombre de routes d'accès aux ressources ont été construites pour faciliter le travail en forêt ou d'autres formes d'activité et pour donner accès aux régions utilisées pour la récréation. La plus importante est la route du lac Hanson ou route 106 qui traverse le sud-est et se trouve à proximité de certains lacs présentant d'excellentes possibilités pour la pêche sportive et de certaines des régions forestières les plus productives. La route 165, route de moindre qualité qui traverse le nord du territoire, relie ces deux routes. La 165 a été construite pour faciliter les déplacements des camions transportant du minerai extrait du secteur de roches précambriennes situé au nord du lac La Ronge jusqu'à la fonderie de Flin Flon, au Manitoba. La route menant de Montreal Lake à La Ronge suivait autrefois la rive orientale du lac Montréal; la route 2, utilisée aujourd'hui, a été construite sur la rive occidentale.

Les seuls établissements permanents sont les petites communautés de Montreal Lake, de Timber Bay et de Molanosa. A l'heure actuelle, l'exploitation de la forêt, la pêche et la chasse sont les principales sources de revenus du territoire.

### POSSIBILITÉS RÉCRÉATIVES

Malgré la construction de nouvelles routes et le rôle de centre administratif du nord de la Saskatchewan récemment confié à la ville de La Ronge, le territoire est encore très éloigné. La route menant de Prince Albert à La Ronge a favorisé la circulation du côté ouest puisque c'est elle qu'empruntaient vers le nord les administrateurs et les prospecteurs en quête de minéraux du Bouclier canadien. Au cours des trente dernières années, cette route a conduit au lac La Ronge un nombre sans cesse croissant d'amateurs de pêche sportive et, une fois prolongée, des vacanciers l'ont empruntée pour se rendre dans la région du Bouclier canadien. La route du lac Hanson est beaucoup plus récente mais elle a amélioré les conditions faites à la récréation sur le territoire; elle passe en effet à proximité d'un grand nombre de petits lacs et de régions de bas-plateaux présentant de bonnes possibilités récréatives.

Les secteurs de bas-plateaux présentent des possibilités variant la plupart du temps de faibles à très faibles (classes 5 à 7). Les marais, les fondrières et les marécages de grandes dimensions situés au nord de Montreal Lake, au nord du lac Meeyomoot, au sud du lac La Ronge et près du Grand lac Sandy présentent très peu de possibilités pour la récréation et ont été placés dans la classe 7.

D'autres unités de bas-plateau présentent de meilleures possibilités. Certaines comme les collines Thunder, les collines Wapawekka et l'escarpement profondément disséqué des collines Cub appartiennent à la classe 5 à cause de leur allure topographique spéciale et de la faune qui y vit. La région morainique vallonnée et parsemée de kames qui renferme les lacs Steepbank, Clarence et Summit ainsi que d'autres petits lacs et divers cours d'eau présente une grande diversité au niveau du modelé, de la végétation et de la faune. Les rivages de ces petits lacs présentent des possibilités modérées pour la pêche sportive, les promenades en bateau et le campisme. Le cours supérieur de la rivière Nipekamew, malgré ses rapides, ainsi que les rivières Montréal et Bear se prêtent à diverses activités: canotage, pêche sportive et campisme. Dans le sud, à l'est du lac Fishing inférieur et à l'intérieur du parc provincial de Nipawin, un très gros esker appartient à la classe 5.

Les lacs sont les principaux centres d'attraction pour la récréation. C'est une région de pêche sportive réputée et il y a des chalets, des terrains de campisme et des camps de pêche sur les bords d'un grand nombre de lacs. Ces lacs présentent une grande diversité au niveau de leur taille, de la nature de leurs rives et de leur pittoresque; cette diversité et d'autres caractéristiques multiplient leurs possibilités pour la récréation.

Les rivages méridionaux du lac La Ronge possèdent une plage de classe 2 et un certain nombre d'unités présentant des possibilités modérées ou modérément élevées. Une grande partie des rivages présentent des possibilités faibles ou modérément faibles par suite de la présence d'arrière-plages mal drainées ou d'avant-plage parsemées de gros blocs. Le lac Montréal présente à peu près les mêmes conditions mais, à cause d'un piètre drainage, la majeure partie des rives appartiennent aux classes 5 et 6. Il y a de forts vents sur les lacs La Ronge et Montréal mais ce facteur ne diminue pas leurs possibilités. Les lacs du nord aux eaux profondes comme le lac La Ronge se prêtent mal, à cause de la basse température de leurs eaux, à des activités de plage et à la baignade qui ne peuvent être pratiquées que dans les nombreuses baies abritées aux eaux peu profondes.

Sur le troisième plus grand lac, le lac Wapawekka, les arrière-plages sont habituellement bien drainées et couvertes d'arbres; il y a quelques bonnes plages. Les arrière-plages sont plus pittoresques que celles du lac Montréal parce que le relief y est plus marqué et à cause de la diversité des affleurements rocheux. Vers l'est, la rivière Deschambault, placée dans la classe 5CAK, mène du lac Wapawekka au lac Deschambault et, par le biais d'autres cours d'eau et de lacs et après des portages, conduit à l'historique rivière Sturgeon-weir et à son réseau hydrographique.

Les lacs du secteur centre-sud sont plus petits mais un grand nombre d'entre eux ont des rivages qui présentent des possibilités variant de modérées à très élevées. Dans l'ensemble, leurs arrière-plages sont bien drainées et boisées et présentent de bonnes possibilités d'aménagement. La plupart des lacs occupent des dépressions profondes, d'autres, des chenaux de fusion glaciaire. A l'extrémité septentrionale de certains lacs, comme les lacs Whiteswan, les arrière-plages sont mal drainées et se confondent avec les marécages. Les lacs Whiteswan et East Trout, le Petit lac Bear et le lac Fishing inférieur comptent parmi les meilleurs lacs de ce groupe et possèdent tous de très bonnes plages. Plus à l'est, le Grand lac Sandy possède des rivages de potentiel modéré à modérément faible, exception faite des basses rives orientales que bordent des fondrières. Les conditions de pêche sportive sont bonne dans la plupart des lacs.

De nombreux lacs plus petits, comme les lacs Molanosa et Shallow, ainsi que certains rivages des îles des lacs Maymoot, Nipekamew, Montréal et d'autres lacs offrent un excellent habitat pour le canard. Les possibilités d'observer ou de chasser le canard ou l'orignal augmentent les possibilités du territoire ajoutant à la variété et à la durée des activités reliées à la récréation.

*Classement des possibilités par J.H. Richards, Département de géographie, Université de Saskatchewan, Saskatoon, 1973.*